n°. 280. observations sur les Epilepsies par Louis. 1

1744 La varieté des circonstances qui accompagnent l'epilepsie etant presque sans nombre, on ne peut trop recueillir de faits pour pouvoir determiner quelque chose sur cette maladie: le grand nombre des personnes qui en sont attaquées à la salpetriere me mettant à portée de fournir ces faits je donneray ceux qui m'ont paru devoir etre rapportez

jay deja eu l'honneur de communiquer à l'academie deux observations sur ce sujet: l'une d'une fille qui est tout à fait delivrée de cette maladie par l'amputation que jay eté obligé de faire à la partie ou elle en sentoit constamment les premiers effets, l'autre d'un homme qui s'en preservoit depuis dix ans par l'ecoulement d'un cautere quil entretenoit à une jambe, et dont il ressentit ~~ressentoit~~ les attaques par la suppression de cet ecoulement; l'observation suivante y a beaucoup de rapport et peut la confirmer:

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Premiere observation

une femme de 31 ans, fut saisie de frayeur à l'age de 8 ans à la presence d'un homme qui dormoit etendu sur un escalier obscur; elle eut depuis ce temps un accès d'epilepsie tous les deux ou trois mois, dont elle fut delivrée à 14 ans lorsque le flux menstruel commenca à paroitre. elle se maria a 25 ans, eut deux maris dans lespace de 5 années: elle fut si sensiblement touchée de la mort du second qui la laissa grosse de 4 mois, quimmediatement apres ses couches, les attaques d'epilepsie se renouvellerent apeuprès comme elle les avoit avant l'age de puberté. elle tomba le 16e. janvier dernier 1744 sur un pöele fort chaud sur lequel elle se brula la partie inferieure de l'avant bras, et la partie Externe du carpe et des doigts; elle fut Envoyée à l'hotel dieu ou on luy coupa le doigt index et les deux dernieres phalanges de celuy du milieu; elle fut six mois à guerir, et pendant

tout ce temps elle n'eût aucune attaque, et depuis que la cicatrice est formée parfaittement elle tombe de temps a autre, mais les accès sont bien moins violens; ils luy sont annoncés par des eblouissements.

L'on voit sensiblement que la suppuration d'un ulcere peut empecher les retours de l'epilepsie; l'observation qui suit fait voir que si la suppuration n'est pas toujours si efficace, elle peut au moins addoucir et mitiger les accidens.

Seconde observation.

une femme de 46 ans est Epileptique depuis sept ou huit années, la cause en peut être rapportée à une peur comme dans la personne qui fait le sujet de l'observation precedente. il y a environ cinq ans que surprise inopinement par son accès elle tomba au feu et se brulâ les deux bras assés legerement. la cure dura six semaines pendant lequel temps elle n'eût que deux accès fort legers

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

et elle en auroit dû avoir quatre ou cinq plus violens; peut etre en auroit-elle été tout afait exempte si la suppuration eut ete plus abondante et que l'impression du feu eut ~~eut~~ un peu plus ~~penetrée~~ penetré.

Les deux observations qui suivent sembleroient opposées a ~~celle~~ que les deux precedentes viennent d'etablir, si le succès seul determinoit la bonté des observations.

3e. observation. une fille de 25 ans tombe d'epilepsie depuis son bas ages, et chaque accès luy est annoncé par un fourmillement dans tous les doigts de la main gauche. ses Règles parurent à l'age de 15 ans, mais bien loin de l'avoir delivré de son facheux etat, il augmenta ~~au contraire~~, et les secousses convulsives devinrent plus violentes: il y à pres de cinq ans que dans un accès, elle tomba dans le feu, et se brula la peau sur toute l'etendüe de l'omoplatte gauche, et le long de la portion superieure du muscle

trapeze jusques au derriere de l'oreille du même coté.
cette brulure à suppuré six mois sans qu'elle en
recoive aucun soulagement, son mal en est au contraire
augmenté par la frequence et la violence des accès
qui luy prennent tous les huit à douze jours, jusqu'à
3 et 4 fois de suitte à demie heure d'intervalle.

4.e observation. une fille de 26 ans, attaquée d'epilepsie
depuis l'age de 13, et reglée fort regulierement
depuis celuy de 14, ~~c'est~~ à dire un an apres le
commencement de sa maladie, avoient ses accès
periodiquement tous les mois ou six semaines, qui
commencoient par un fourmillement aux doigts de
la main gauche. elle fut brulé il y a 3 ans
la main droitte, et elle tombe depuis plus
frequemment; il y a cependant apparence, à voir
le triste etat de la partie, que la brulure
à eté profonde, et que la suppuration doit avoir

été longue et copieuse.

Ces deux cas prevaudroient-ils sur une infinité d'observations qui prouvent evidemment que les suppurations soit accidentelles, soit quelles soient procurées par lusage des cautres et des setons, sont tres efficaces. il est facile de concevoir quil ya une extreme differrence entre un ecoulement ~~salutaire~~ que l'art procure, sur la determination du malade qui en espere un heureux succès, ~~ou dun~~ et une evacuation qui est la suitte d'un accident imprevû, capable par la douleur quil cause et la frayeur quil occasionne de renouveller, d'augmenter même les effets de la maladie antecedente.

L'on a vû par la premiere des observations que je viens de Rapporter, que les menstrües qui surviennent peuvent être quelque fois la guerison des filles qui sont attaquées d'epilepsie avant l'age de puberté; cela s'accorde avec la doctrine d'hyppocrate â

â à comitiali morbo juvenes &c. ætates mutatione liberantur.

quand le flux menstruel ne les en delivre pas totalement, elles peuvent au moins en etre soulagées.

5.e observation. une fille de 23 ans Epileptique depuis l'age de sept a huit, avoit fort Regulierement un accès toutes les nuits; il y a trois ans que ses Regles parurent, et depuis ce temps elle ne sent quelque fois rien de dix jours, et n'est pas si agitée dans le paroxisme qu'avant d'être ~~quelle devoit~~ ~~etre~~ incommodée.

si le flux menstruel à été a quelques unes l'epoque de la guerison ou du soulagement; il y en a d'autres aux quelles les menstrues paroissent devenir causes aggravantes, comme on le voit par la 6.e observation; il y a même des filles qui ne se sentent d'epilepsie que depuis quelles sont devenu Reglées sans quelles puissent en Entrevoir d'autres causes.

6.e observation une fille de 21 ans, d'un bon temperament, fut Reglée a l'age de 15.e; depuis ce temps

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

elle a tous les mois deux ou trois attaques Epileptiques dans un jour. elles en est avertie par une violente douleur de tete, qui selon son Expression, la brule comme du feu. elle se garentit de l'accès lorsquelle trouve promptement sous sa main un grand coup d'eau fraiche pour boire. ces circonstances pourroient faire Regarder ces mouvemens Epileptiques comme un Symptome de passion hysterique, plutot que comme une Epilepsie idiopatique.

L'épilepsie ne pourroit elle pas cependant etre essentielle, et accompagner Regulierement le flux menstruel, etre même la cause determinante de cette Evacuation.

7e. observation. une fille de 36 ans, d'un bon temperament, Reglée tres Exactement depuis l'age de 18, eut une premiere attaque d'épilepsie il ya 12 ans, (elle en avoit alors 24) après une frayeur, Les accès Reviennent periodiquement tous les mois ou cinq semaines. elle en a des pressentimens deux jours auparavant à la fin de l'accès, ou le lendemain au plutard les menstrues paroissent. Louis.